



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000
E-mail: nti@nebih.gov.hu;
ppp.registration@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Előadó: Kővári Melinda

Határozatszám: 04.2/4792-2/2016.

Oldalak száma: 6 oldal

Melléklet: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

Tárgy: Fusilade Forte gyomirtó

permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer 02.5/2465/2/2008. MgSzHK** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – módosítja, egyúttal a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét megváltozott formában, a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki, melyben jelen határozat 1.5; 2.1; 4; 5.4; 5.5 pontjai tartalmazzak új előírásokat.

Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 02.5/2465/2/2008. MgSzHK |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Fusilade Forte |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2017. december 31. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Syngenta Crop Protection A. G.
CH-4002 Basel, Svájc |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Syngenta Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 2. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|---|--|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc) |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | gyomirtószer |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | emulzióképző koncentrátum (EC) |
| 2.4. Növényvédő szer összetétele: | |
| 2.4.1. hatóanyag | ISO név fluazifop-P-butil |
| | CAS szám 79241-46-6 |
| | IUPAC név <i>butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]phenoxi}propionát</i> |
| | tiszta hatóanyag részaránya 150 g/l |

3. Minőségi követelmények:**3.1. Hatóanyag tartalom****3.1.1. fluazifop-P-butil (HPLC) 15,8 ± 0,9 % (m/m)****3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:** Meg kell felelnie az **EC** formuláció **FAO** követelményeinek.*Tájékoztató jellegű adatok:***Emulzió stabilitás (MT 36,3)**

0 h kezdeti: teljes

0,5 h „krém”, maximum <2 cm³

24 h ismételt emulzióképzés: teljes

24,5 h „krém” maximum <2 cm³**Habzóképesség (MT 47,2) <60 cm³ (1 perc után)****Tárolási stabilitás**

tárolási stabilitás 0°C-on (MT 39,3)

tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)

fázis szétválás mértéke < 0,3ml

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak.

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések max. száma	A kezelés időpontja	A kijuttatáshoz szükséges	
				szer (l/ha)	víz (l/ha) mennyisége
napraforgó, őszi káposztarepce	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-2,5	250-300
őszi káposztarepce	Gabona árvaekelés	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,4-0,6	250-300
cukorrépa, lucerna, lóhere, vöröshagyma*, fokhagyma, mogyoróhagyma, mák	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	gyomfejlettséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
száraz borsó, száraz bab	Magról kelő egyszikű gyomok	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-1,5	250-300
burgonya	Magról kelő egyszikű gyomok	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-1,5	250-300
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, szőlő (bor, csemege) sorkezelés	Magról kelő és évelő egyszikű gyomok	1	gyomfejlettséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
erdészet	Siska nádtíppan felszaporodásának megakadályozására	1	gyomfejlettséghez igazítva	1,5-2,0	250-300 Légi: 50-70

***újhagymában nem használható**

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8-1,2 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es fejlettségekor. Őszi káposztarepcében a gabona árvakelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban kizárólag virágzás előtt alkalmazható.

Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható.

Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siskanádtippan és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható.

Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt.

Légi kijuttatás: Kizárólag erdészetben, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi kijuttatás nem megoldható. **Helikopterrel történő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő adalék hozzáadása kötelező.** Lémennyiség: 50-70 l/ha.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m**, légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
napraforgó	90
őszi káposztarepce	90
cukorrépa	56
lucerna, lóhere	56
száraz borsó, száraz bab	90
burgonya	56
vöröshagyma, fokhagyma,	56
mák	90
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva	56
szőlő (bor, csemege)	56

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.5.2. Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. *Kiszерelés térfogata/tömege:* 1 l; 5 l

6.2. *Csomagolószer anyaga:* műanyag flakon/kanna

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

8. Forgalmazási kategória: II.

Az ügyfél köteles a raktárában vagy a már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen határozatnak megfelelő módosításokat átcímkezésével feltüntetni legkésőbb **2016. október 15.** napjáig.

A szer új gyártási tételei csak a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhetnek forgalomba.

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az ügyfél továbbá köteles a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer** felhasználására vonatkozóan a jelen határozatban foglalt szigorításokról körlevél útján tájékoztatni kereskedelmi partnereit és a felhasználókat a szigorítás hatályba lépésével egyidejűleg.

Az engedély módosítás eljárási díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. július 7.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(214/2016.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **02.5/2465/2/2008. MgSzhK**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Fusilade Forte**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2017. december 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Syngenta Crop Protection A. G.**
CH-4002 Basel, Svájc
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Syngenta Kft.**
1117 Budapest, Alíz u. 2.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **gyomirtószer**
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: **emulzióképző koncentrátum (EC)**
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. hatóanyag **ISO név fluazifop-P-butil**
- CAS szám 79241-46-6**
- IUPAC név butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]phenoxi}propionát**
- tiszta hatóanyag részaránya 150 g/l**

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. **fluazifop-P-butil (HPLC) 15,8 ± 0,9 % (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: **Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek.**

Tájékoztató jellegű adatok:

Emulzió stabilitás (MT 36,3)

- 0 h kezdeti: teljes
- 0,5 h „krém”, maximum <2 cm³
- 24 h ismételt emulzióképzés: teljes
- 24,5 h „krém” maximum <2 cm³

Habzóképeség (MT 47,2) <60 cm³ (1 perc után)

Tárolási stabilitás

tárolási stabilitás 0°C-on (MT 39,3)

tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)

fázis szétválás mértéke < 0,3ml

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak.

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések max. száma	A kezelés időpontja	A kijuttatáshoz szükséges	
				szer (l/ha)	víz (l/ha) mennyisége
napraforgó, őszi káposztarepce	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-2,5	250-300
őszi káposztarepce	Gabona árva kelés	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,4-0,6	250-300
cukorrépa, lucerna, lóhere, vöröshagyma*, fokhagyma, mogyoróhagyma, mák	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	gyomfejltséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
száraz borsó, száraz bab	Magról kelő egyszikű gyomok	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-1,5	250-300
burgonya	Magról kelő egyszikű gyomok	1	Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt	0,8-1,5	250-300
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, szőlő (bor, csemege) sorkezelés	Magról kelő és élő egyszikű gyomok	1	gyomfejltséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
erdészeti	Siska nádtippán felszaporodásának megakadályozására	1	gyomfejltséghez igazítva	1,5-2,0	250-300 Légi: 50-70

***új hagymában nem használható**

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8-1,2 l/ha dózisban. Élő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es fejlettségekor. Őszi káposztarepceben a gabona árva kelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban kizárólag virágzás előtt alkalmazható.

Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható.

Kizárólag foltkezelésre csillagpázsit, siskanádtippán és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható.

Erdészetben felszaporodó siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt.

Légi kijuttatás: **Kizárólag erdészetben**, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi kijuttatás nem megoldható. **Helikopterrel történő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő adalék hozzáadása kötelező.** Lémennyiség: 50-70 l/ha.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	közepesen veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m**, légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
napraforgó	90
őszi káposztarepce	90
cukorrépa	56
lucerna, lóhere	56
száraz borsó, száraz bab	90
burgonya	56
vöröshagyma, fokhagyma,	56
mák	90
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva	56
szőlő (bor, csemege)	56

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknak és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.5.2. Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 1 l; 5 l

6.2. Csomagolószer anyaga: műanyag flakon/kanna

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

8. Forgalmazási kategória: **II.**

Budapest, 2016. július 7.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.