



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási
Főosztály

Szám: 35756/2001.

Előadó: Dr. Ocskó Z.

Dr. Princzinger G.

Baranyi T.

Tárgy: **PIRIMOR 50 WG**
rovarölő permetezőszer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

Syngenta AG.
Svájc

A növényvédelemről szóló XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a *Pirimor 50 WG* rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Syngenta AG., Svájc.

2. A szer faja: 500 g/kg pirimikarb = 2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-il-dimetil-karbamát hatóanyagot tartalmazó, vízoldható rovarölő szer granulátum.

3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyagtartalom (GC): $50,0 \pm 1,5 \%$ (m/m)
szemcseméret eloszlás (50 μ): $< 90 \%$ (m/m)

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer(kg/ha)	víz (l ha)
kalászosok, cukorrépa	levéltetvek	0,25-0,30	300-500
dohány, napraforgó		0,25-0,30	300-500
mák		0,8-1,0	300-500
almatermésűek		0,35-0,50	500-1000
őszibarack		0,8-1,0	500-1000
uborka, paprika, paradicsom, káposztafélék, saláta		0,35-0,50	200-400

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Méreg.

Vízi szervezetekre mérsékeltlen veszélyes. A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. 50 méter, illetve egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint. Nem alkalmazható hidrogeológiai védőterületeken, illetve ebből a szempontból "A, fokozottan érzékeny" kategóriába sorolt területeken.

Méhekre nem veszélyes.

Közegészségügyi szempontból veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
kalászosok, cukorrépa, mák	14	0,5
paprika, paradicsom, uborka	3	0,5
káposztafélék, őszibarack	7	0,5
almatermésűek	10	0,5
napraforgó	28	0,5
saláta	14	1,0
dohány	21	1,0

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés *előkészítőknél*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli; *kijuttatóknak*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, FFP3SL részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: *karbamát inszekticid mérgezés/* orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Jelzések: S 1/2, S 3/7/9, S 13, S 20/21, S 24/25, S 26, S 27, S 29, S 36/37/39, S 46.

Terápia: Atropin, reaktivátor adása tilos!

7. Tűzveszélyességi besorolás: Ném tűzveszélyes (E).

8. Forgalmazási kategória: III.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer raktárban 3 év.

10. Az engedély érvényessége: 2004. november 20.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Szántóföldi kultúrákban a védekezést előrejelzésre alapozva, de legkésőbb a levéltetvek betelepülésének kezdetén kell megkezdeni. Elhúzódo rajzás, ill. erős fertőzés esetén szükség szerint ismételtlen védekezni kell.

Almában és őszibarackban a levéltetvek ősanya utódnemzedékei ellen, a kolónia képzés kialakulása előtt kell védekezni, a gazdacserés levéltetű fajok esetében a nyári ivaros nemzedékek ellen is.

Szántóföldi zöldségfélékben sárgatálás előrejelzés alapján a kártevők megjelenésekor kell megkezdeni a kezeléseket, és az utódnemzedékek ellen többször meg kell ismételni. Zöldségfélékben a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀ = 100,3 mg/kg

- enyhén bőrirritatív, mérsékelt szemirritatív hatású készítmény (R 36, R 38).

Budapest, 2001. november 20.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelével:

Derzi Anikó
/Derzi Anikó/

