

2464



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási
Főosztály

Szám: 35015/2000.
Előadó: Dr. Ocskó Z.
Szentey L.

Tárgy: **RACER**
gyomirtó permetezőszer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye

Syngenta
Svájc

A növényvédelemről szóló XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a *Racer* gyomirtó permetezőszer 15179/1985. MÉM sz. korlátozott engedélyét *visszavonom*, egyidejűleg forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Syngenta, Svájc.
2. A szer faja: 25 % fluorkloridon = 1-(m-trifluor-metil)-3-klór-4-klór-metil-2-pirrolidon hatóanyagot tartalmazó folyékony gyomirtó permetezőszer.
3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom (GC):	24,0 ± 1,5 % (m/m)
emulzióstabilitás (1 %-os konc-ban, 2 óra után):	max. 2 % reverzibilis ülepedés megengedett

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer	víz
		mennyisége (l/ha)	
napraforgó	magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0-3,0	200-300
sárgarépa, petrezselyem	magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0	200-300
burgonya (étkezési)	magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0-2,2	200-300

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyenge méreg.

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes.

Méhekre mérsékelten veszélyes.

Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
napraforgó	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	0,05
burgonya, sárgarépa, petrezselyem	90	0,05

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés *előkészítőknak*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli; *kijuttatóknak*: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (fóliaházban, üvegházban) végzett permetezéskor - előbbieket mellett - FFA1B1P2SL szelepes szűrő félálarc.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után *lásd: általános eljárás/* orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes (C).

8. Forgalmazási kategória: I.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

10. Az engedély érvényessége: 2011. február 6.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Napraforgóban preemergens kijuttatás esetén trifluralin, benfluralin, EPTC hatóanyagú készítményekkel alapkezelt területen önmagában, egyebekben a napraforgóban pre-emergensen kijuttatásra engedélyezett egyszikűeket irtó készítmények engedélyokiratban előírt dóziséval tankkombinációban juttatható ki.

A készítményt napraforgóban trifluralin, benfluralin, EPTC hatóanyagú szerek engedélyokiratukban előírt dózisaival tankkombinációban is kijuttathatjuk, ez esetben a permetezést követően 6-8 cm mélyen azonnal a talajba kell dolgozni.

A Racer dózisát a talaj típusától, a gyomfajok összetételétől és a gyomosodás várható mértékétől függően kell megválasztani.

Sárgarépa, petrezselyem kultúrákban vetés után, kelés előtt preemergensen kell kipermetezni a Racert. A készítmény elsősorban a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony.

Burgonyában a kezelést a végleges bakháta kialakítása után, a burgonya kelése előtt kell elvégezni.

A készítmény a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony.

Hatáskiegészítés céljából a burgonyában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen engedélyezett Dual Gold 960 EC, Proponit 840 EC, Stomp 400 SC készítmények engedélyokiratban előírt dózisaival kombinálható.

Esetenként a Racer a kultúrnövényen levélérmenti sárgulást okozhat, melyet az maradéktalanul kinő.

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀: 1864 mg/kg

- erősen szem-, enyhén bőrirritatív hatású készítmény.

Budapest, 2001. február 6.

Tar Ferenc s.k.
mb. főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

Derzsi Anikó
(Derzsi Anikó)

