



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

Növényegészségügyi és Talajvédelmi Főosztály

Szám: 46811/2004.

Előadó: Dr. Molnár J.

Dr. Princzinger G.

Tárgy: **TANGO STAR**
gombaölő permetezőszerszengedély-
nek módosítása és kiegészítése

BASF Hungaria Kft.

1034 Bp., Seregély u. 1-5.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a *Tango Star* gombaölő permetezőszerszengedélyét 12218/2002. FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

módosítom és egészítem ki:

4. Felhasználható:

<i>kultúra</i>	<i>károsító</i>	<i>a kijuttatáshoz szükséges</i>	
		<i>szerszengedély</i>	<i>víz</i>
		<i>menyiség (l/ha)</i>	
<i>kalászosok</i>	<i>lisztharmat, rozsdabetegségek, pirenofórás, szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis</i>	<i>0,8-1,2</i>	<i>250-350</i>
<i>cukorrépa</i>	<i>lisztharmat, cercospórási levélragya</i>	<i>1,0-1,2</i>	<i>400-600</i>

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt a *kalászosokban* a tenyészidő folyamán a fertőzöttségi helyzettől függően egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni.

A korábbi, szárbainduláskori felhasználás akkor indokolt, ha korai erős lisztharmatfertőzés, vagy más betegség, pl. pirenofórás vagy szeptóriás levélfoltosság korán lép fel.

A későbbi időpontban való kijuttatás a felső leveleket és a kalászt veszélyeztető lisztharmat, kalászfuzáriózis, rozsda, ill. egyéb levélbetegségek (pirenofórás, vagy szeptóriás levélfoltosság) ellen nyújt védelmet. Ennek ideje a kalászolástól a virágzás kezdetéig terjedő időszakra tehető.

Átlagos fertőzési viszonyok között a kisebb, míg erős fertőzési nyomás, ill. a kórokozók számára kedvező időjárási viszonyok között a nagyobb adag használata javasolt. Légi kijuttatás esetén - a jobb permetlé eloszlás miatt - a helikopter alkalmazása előnyös.

Cukorrépában megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni. A védekezést a fertőzési nyomástól függően 2-4 hetes időközökben, 1-2 alkalommal javasolt megismételni. Erősebb fertőzés esetén a nagyobb dózis választása indokolt.

2. Légi kijuttatás: kalászosokban 60-80 l/ha vízmennyiséggel.


(A légi kijuttatásra vonatkozó engedély 2004. december 31-ig érvényes.)

Az engedélykirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 2004. május 22.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelével:


/Derzsi Anikó/



(94/2004.)