



FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM  
Agrárkörnyezet-gazdálkodási és  
Növényvédelmi Főosztály

Tárgy: L o n d a x  
gyomirtó permetezőszer  
korlátozott forgalomba  
hozatali és felhasználási engedélye

Szám: 9436/1992.  
Előadó: dr. Kádár A.

Du Pont de Nemours Kft.  
Budapest

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a Londax gyomirtó permetezőszer k o r l á t o z o t t forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: Du Pont de Nemours & Co., USA
2. A szer faja: 60 % benszulfuron-metil= metil-2-////(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)amino/karbonil/amino/szulfonil/benzoát hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szer granulátum.
3. Előírt minőségi feltételek:  
hatóanyag tartalom (HPLC) : 62 ± 2 % (m/m)
4. Felhasználható: Rizs kultúrában kétszikű gyomok ellen, 85-100 g/ha mennyiségben.
5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyakorlatilag nem mérgező.  
Halakra nem veszélyes.  
Méhekre nem veszélyes.  
Közegészségügyi szempontból veszélyes.  
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradványok:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradvány (mg/kg)
rizs	nincs korlátozás	0,02

Tilos a szert, fel nem használt maradványát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknak és kijuttatóknak: munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, laboratóriumi arcvédő (belégzést kerülni).

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: á l t a - l á n o s e l j á r á s / orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes (C).  
8. Forgalmazási kategória: Nagyüzemben használható.  
9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

#### Mellékletek

#### 1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítmény a rizs 2-3 leveles állapotától a bokrosodás végéig használható. A megfelelő hatás eléréséhez a területen egyenletes, 3-10 cm közötti vízborítást kell biztosítani. A kezelést követően a területre 7 napig vizet ráengedni, vagy lecsapolni tilos.

A szer hatásos a vízből kinőtt, de 7-10 cm-nél még nem magasabb, valamint a víz alatt levő gyomokra.

A szerre érzékeny kétszikű gyomok: *Alisma* spp., *Marsilea* spp., *Potamogeton* spp., *Sagittaria* spp., *Butomus* spp., *Cyperus* spp., *Scirpus* spp., *Eleocharis acicularis*, *Typha* spp.

A kijuttatáshoz földi ill. légi úton 80-150 liter/ha víz szükséges. Korai alkalmazás esetén kombinálható molinát és bentiokarb hatóanyagú készítményekkel.

#### 2. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD 5000 mg/kg  
50

Budapest, 1992. május 18.

A kiadmány hiteléül:

Szele György  
/ Szele Gizéne



dr. Eke István s.k.,  
főosztályvezető h.

(81/92)