

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Nufarm Hungária Kft.** (1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.) ügyfélnek a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az engedélyező hatóság a **Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/2465/2/2008. MgSzhK számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

#### **m ó d o s í t j a:**

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

#### **6. Kiszерelés, csomagolás:**

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 200 ml; 1 liter; 5 liter

6.1.1. A 200 ml-es csomagoláson nem kötelező az alábbi kultúrák feltüntetése:

*napraforgó, őszi káposztarepce, cukorrépa, lóhere, száraz borsó, erdészet*

6.2. Csomagolószer anyaga: műanyag flakon/kanna

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az új csomagolási egységre vonatkozó termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2019. június 3.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(266/2019.)



# Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

## Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

---

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/2465/2/2008. MgSzHK
- 1.2. Növényvédő szer neve: Fusilade Forte
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft.  
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: emulzióképző koncentrátum (EC)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. hatóanyag ISO név **fluazifop-P-butil**
- CAS szám 79241-46-6
- IUPAC név *butil (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]phenoxi}propionát*
- tiszta hatóanyag részaránya **150 g/l**

### 3. Minőségi követelmények:

#### 3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. **fluazifop-P-butil** (HPLC) **15,8 ± 0,9 % (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az EC formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

#### Emulzió stabilitás (MT 36,3)

- 0 h kezdeti: teljes
- 0,5 h „krém”, maximum <2 cm<sup>3</sup>
- 24 h ismételt emulzióképzés: teljes
- 24,5 h „krém” maximum <2 cm<sup>3</sup>

Habzóképeség (MT 47,2) <60 cm<sup>3</sup> (1 perc után)

**Tárolási stabilitás**

tárolási stabilitás 0°C-on (MT 39,3)

tárolási stabilitás emelt hőfokon (MT 46.3)

fázis szétválás mértéke < 0,3ml

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az emulzióstabilitási előírásoknak.

**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	Kezelések max. száma	A kezelés időpontja	A kijuttatáshoz szükséges	
				szer (l/ha)	víz (l/ha) mennyisége
napraforgó, őszi káposztarepce	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	<b>Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt</b>	0,8-2,5	250-300
őszi káposztarepce	Gabona árvakelés	1	<b>Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt</b>	0,4-0,6	250-300
cukorrépa, lucerna, lóhere, vöröshagyma*, fokhagyma, mogyoróhagyma, mák	Magról kelő egyszikű gyomok, fenyércirok, tarackbúza	1	gyomfejltséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
száraz borsó, száraz bab	Magról kelő egyszikű gyomok	1	<b>Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt</b>	0,8-1,5	250-300
burgonya	Magról kelő egyszikű gyomok	1	<b>Kizárólag a kultúrnövény virágzása előtt</b>	0,8-1,5	250-300
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, szőlő (bor, csemege) sorkezelés	Magról kelő és élő egyszikű gyomok	1	gyomfejltséghez igazítva	0,8-2,5	250-300
erdészet	Siska nádtippán felszaporodásának megakadályozására	1	gyomfejltséghez igazítva	1,5-2,0	250-300 Légi: 50-70

**\*újhagymában nem használható**

**Előírt növényvédelmi technológia:**

A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 3-5 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 0,8-1,2 l/ha dózisban. Élő egyszikűek közül a rizómás fenyér-cirok ellen. 1,8-2,0 l/ha, tarackbúza ellen 2,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, azok 20-30 cm-es fejlettségekor. Őszi káposztarepcebén a gabona árvakelés 3-5 cm-es fejlettségéig kell kipermetezni a készítményt, 0,4-0,6 l/ha dózisban. Napraforgó, repce, burgonya, száraz borsó és száraz bab kultúrákban kizárólag virágzás előtt alkalmazható.

Szőlő és gyümölcs ültetvényekben kizárólag sorkezelésre használható.

**Kizárólag foltkezelésre** csillagpázsit, siskanádtippan és nád ellen 2,6-2,8 l/ha dózisban használható.

**Erdészeten** felszaporodó siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) növekedésének gátlására 1,5-2,0 l/ha adagban, tavasszal, a gyomnövény intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt.

**Légi kijuttatás:** **Kizárólag erdészeten**, kizárólag a természetes felújítású, legalább 3 ha kiterjedésű, nehezen megközelíthető, rossz terepviszonyú területeken lehetséges, abban az esetben, ha a földi kijuttatás nem megoldható. **Helikopterrel történő kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítő adalék hozzáadása kötelező.** Lémennyiség: 50-70 l/ha.

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

**5.1. Veszélyességi besorolás:**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	<b>&gt;2000 mg/kg</b>
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	<b>közepesen veszélyes</b>
Méhveszélyesség:	<b>nem jelölésköteles</b>
Tűzveszélyességi besorolás:	<b>nem jelölésköteles</b>

**5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:**

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

<b>H361d</b>	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
<b>H317</b>	Allergiás bőrreakciót válthat ki
<b>H411</b>	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P202</b>	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
<b>P280</b>	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
<b>P302+P352</b>	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
<b>P308+P313</b>	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

<b>EUH401</b>	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

**5.2. Különleges S-mondatok:**

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m**, légi kezelés esetén **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

**5.4. Várakozási idők**

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

<b>kultúra</b>	<b>várakozási idő (nap)</b>
napraforgó	90
őszi káposztarepce	90
cukorrépa	56
lucerna, lóhere	56
száraz borsó, száraz bab	90
burgonya	56
vöröshagyma, fokhagyma,	56
mák	90
alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva	56
szőlő (bor, csemege)	56

## **5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

### **5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

*Előkészítőknak és kijuttatóknak:* növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**5.5.2. Elsősegélynyújtás:** *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

## **6. Kiszерelés, csomagolás:**

**6.1. Kiszерelés térfogata/tömege:** 200 ml; 1 liter; 5 liter

**6.1.1.** A 200 ml-es csomagoláson nem kötelező az alábbi kultúrák feltüntetése:  
*napraforgó, őszi káposztarepce, cukorrépa, lóhere, száraz borsó, erdészret*

**6.2. Csomagolószer anyaga:** műanyag flakon/kanna

**7. Eltarthatósági idő:** fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

**8. Forgalmazási kategória:** **II.**

Budapest, 2019. június 3.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*